

## CONSIGNES SANITAIRES CONSULTATION D'OSTÉOPATHIE EN PÉRIODE DE COVID-19




LE PORT DU MASQUE  
EST OBLIGATOIRE  
AVANT VOTRE ENTRÉE  
DANS LE BÂTIMENT ET  
DURANT TOUTE LA  
DURÉE DE LA SÉANCE :

*De préférence  
chirurgical et  
porté depuis  
moins de 2  
heures*



ARRIVÉE POUR VOTRE  
RDV :

*Sonnez et entrez  
dans le bâtiment.  
Lavez vous les  
mains avec la  
solution hydro-  
alcoolique*



RESPECTEZ LES  
DISTANCES AVEC  
VOTRE PRATICIEN EN  
DEHORS DE L'ACTE DE  
SOIN.

## CONSIGNES SANITAIRES CONSULTATION D'OSTÉOPATHIE EN PÉRIODE DE COVID-19



NE PORTEZ PAS DE  
GANTS ET ÉVITEZ  
LES CONTACTS  
AVEC LES  
SURFACES AUTANT  
QUE POSSIBLE



LAVEZ-VOUS LES  
MAINS EN  
ENTRANT ET EN  
SORTANT DU  
CABINET :

*Une solution hydro-  
alcoolique sera  
proposée*




LES MINEURS  
DOIVENT ÊTRE  
ACCOMPAGNÉS.  
UN SEUL  
ACCOMPAGNANT  
AUTORISÉ


# SIGNALEZ TOUTE PRESENCE DE SYMPTOME DE COVID-19 A VOTRE PRATICIEN

## LES INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LE COVID-19

### Quels sont les signes ?



### Comment se transmet-il ?



- 1 Face à face pendant au moins 15 minutes
- 2 Par la projection de gouttelettes

## STOP CORONAVIRUS

Les gestes pour se protéger et protéger les autres



Se laver très régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude



Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter



Se tenir à au moins 1 m des autres voyageurs



Saluer sans serrer la main et éviter les embrassades

# SI VOUS PRÉSENTEZ UN OU PLUSIEURS FACTEURS DE RISQUE MERCI DE CONTACTER VOTRE PRATICIEN AVANT LE RDV

assurance-maladie.fr

**#Coronavirus #Covid19**

## Quels sont les critères de risque ?

Les critères définis par arrêté de la Haute Autorité de Santé sont les suivants :

- Femmes enceintes
- Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique...)
- Insuffisances respiratoires chroniques
- Mucoviscidose
- Insuffisances cardiaques toutes causes
- Maladies des coronaires
- Antécédents d'accident vasculaire cérébral
- Hypertension artérielle
- Insuffisance rénale chronique dialysée
- Diabètes de type 1 insulino-dépendant et diabète de type 2
- Les personnes avec une immunodépression :
  - pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d'organe et de cellules souches hématopoïétiques
  - maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
  - personnes infectées par le VIH
- Maladie hépatique chronique avec cirrhose
- Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.